

個別オプション血液検査のご案内

健康診断で行う採血で、追加の検査を行うことができます。新たに採血する必要がないため、是非この機会にお申し込みください。

※ 検査費用は全額自己負担となり、検査結果はご本人様のみに通知をいたします。

腫瘍マーカー検査 ～がんが発生すると増えてくる特有な物質の量を測定します～

この検査だけでがんを特定できるものではありませんが、経過を比較することで異変をいち早く疑うことができます。

検査項目と高値となるがんとの関係（●：反応するもの △：一部に反応するもの）

検査項目	男性		女性			肺F	食道	胃	大腸	肺	すい臓	肝臓	胆のう	乳腺	子宮	卵巣	前立腺	甲状腺
	標準A	強化B	標準C	強化D	乳腺E													
CEA	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	△				△
AFP	●	●	●	●	●							●						
CA19-9	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●					
CYFRA		●		●		●	●	△	△	●					△	△		
ProGRP		●		●		●				●								
CA125			●	●	●										●	●		
PSA	●	●															●	
抗 p53 抗体		●		●	●		●		●					●	●			
CA15-3				●	●									●	●	●		
NCC-ST-439		●		●				●	●		●		●	●				

★基準値より高いマーカーがあった場合は、専門医を受診してご相談ください。

★女性は妊娠や月経周期によって高値を示すことがあります。これらが疑われるような場合は専門医で再検査をご相談ください。（AFP、CA125、NCC-ST-439）

男 性		女 性		共 通	
A 男性標準セット	6,000 円	C 女性標準セット	6,000 円	F 肺セット	5,000 円
B 男性強化セット	12,000円	D 女性強化セット	12,000円		
		E 女性乳腺セット	7,000 円		

胃がんリスク検査

ペプシノゲン	胃粘膜の萎縮度を推測し、胃がんになりやすいかどうかを調べる検査です。	2,000 円
ヘリコバクター・ピロリ抗体	ピロリ菌の感染を調べる検査です。ピロリ菌感染が持続すると胃の粘膜が薄く萎縮し、胃がんになりやすくなります。	2,000 円
ABC 検診	「ペプシノゲン」と「ヘリコバクター・ピロリ抗体」の 2 つの検査を組み合わせ、胃がんにかかるリスクをA～Dの 4 群で判定する検査です。	5,000 円

※胃切除後の方やピロリ菌除菌後の方はリスク判定が困難です。除菌治療を受けた方は定期的な内視鏡検査をおすすめします。

肝炎検査

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気がつくにくく、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがあります。早期に発見し治療にあたればウイルスの排除やコントロールが可能です。

B型肝炎	B型肝炎ウイルスに感染した血液等に接触した場合に感染を起こすことがあり、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続く場合（キャリア）があります。当検査ではHBs抗原・抗体を調べ現在の感染の有無やワクチン接種、感染既往による免疫の有無を判断します。	2,000 円
C型肝炎	C型肝炎ウイルスに感染した血液等を介して感染します。感染すると約70%の人が持続感染者となり、病状が進行する場合があります。当検査ではHCV抗体を調べ、C型肝炎ウイルスに感染したことがあるかを判断します。	2,000 円



ウイルス感染症抗体検査

ウイルス感染症に対する免疫と抗体価を調べる検査です。検査の結果ワクチン接種を希望される方は専門医にご相談ください。

風しん	免疫のない妊婦が妊娠初期に風しんにかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気により、心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。	3,000 円
麻疹（はしか）	肺炎や脳炎を引き起こすことがある重篤な病気です。感染力が非常に強く、免疫を持っていない方が感染すると、ほぼ100%発症します。また、妊娠している方が麻疹にかかると、流産・早産を引き起こす可能性があります。	3,000 円
水痘/帯状疱疹（みずぼうそう）	水痘/帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。成人に水痘が発症した場合、重症化するリスクが高いと言われています。帯状疱疹は、みずぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。	3,000 円
ムンプス（おたふくかぜ）	片側あるいは両側性の唾液腺（耳下腺が最も多い）のびまん性腫脹、疼痛、発熱をきたします。成人での発症例では、髄膜炎、精巣炎、熱性痙攣、難聴、脾炎などの合併症によって入院を要する例が比較的多い病気です。	3,000 円
ウイルス抗体 4 種	上記4種類の抗体検査のセットとなります。	10,000 円



アレルギー検査（View39）

アレルギーの原因となることが多い候補物質（吸入・接触19種+食物20種）を一度に調べる検査です。

●吸入・接触（19種）	ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト、ネコ、イヌ、ガ、ゴキブリ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、アルテルナリア、アスペルギルス、カンジダ、マラセチア、ラテックス	12,000 円
●食物（20種）	卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、ピーナッツ、大豆、ソバ、ゴマ、米、エビ、カニ、キウイ、リンゴ、バナナ、マグロ、サケ、サバ、牛肉、鶏肉、豚肉	

※アレルギーの血液検査は参考指標であり、反応を示してもアレルギーを起こさない方もいます。食物でアレルギー反応が疑われ食事療法をお考えの際は、必ずアレルギー専門医にご相談ください。



NT-proBNP 検査 ～心不全の早期発見に有効です～

NT-proBNP は心臓に負担がかかると心臓から血中に放出されるホルモンです。当協会では心電図検査や血液検査などと合わせて心臓への負担を総合的に判断しています。	3,000 円
---	---------

●心不全の注意が必要な方におすすめします

- ・ 血圧、血糖、コレステロールや中性脂肪が高めの方
- ・ 喫煙をされている方
- ・ 肥満の方
- ・ 40歳以上の方
- ・ 不整脈や心臓病を指摘されたことがある方
- ・ 動悸、手足のむくみ、息切れ、だるさのある方

※NT-proBNP は腎臓で代謝される為、腎臓機能が低下すると高値を示します。加齢に伴い男女とも高値を示します。

肥満では低値を示す傾向にあります。ペースメーカーを挿入している人は正しい判定が出来ません。



新型コロナ抗体検査

ワクチン接種あるいは感染既往により獲得したスパイクタンパク抗体価を測定します。感染への抵抗性がどの程度あるかが推測できます。	3,000 円
--	---------